

動きを画像化

時間・空間的拡大

のは、牛のスィー 固定して動きが少ない部分。 れているトリプ 一方、明るく光っている球は よく動いている部分で、たん 用価値は大きい」という。



画像化された、たんばくの動き

球一つが原子 暗い球は

れそう」と大久 すでにエチレン除去剤が市販 包んで保存したところ、長持 されている。 されており、吸着、分解など ち効果が現れたという。 青森産スターキングを用意 し「何もしない」「二平方 あたり六十坪・坪のヒノキチ ち、他がマイナスイオンだっ ている。

の「いま」に比べて した場合に効果が上がる理由 や、ヒノキチオールがエチレ ンを抑制するメカニズムなど を今後調べてみたい」と話し ている。



豊富で、人工臓器がこんなも のか、その役割と限界もよく わかる。百五十余項目にわた る人名・用語解説も貴重な資 料だ。

三田出版会、二千八百円。

が完成した。

500万人以上が検診

ソ連・チェルノブイリ原子 力発電所の事故（一九八六年 四月二十六日）から二年たっ 減っている。（汚染した）五 十萬立方メートルの土壌が密封され た。ドニエプル川とプリピャ 川川の流域には、百万立方 米にのぼる土を使つて堤防 を築き、完全に汚染を防い だ。

ソ連原子力産業省のA・コ フレンコ情報・国際交流部長 らによると、原発（事故炉は 四号炉）建屋内と敷地内の放 射能汚染度は、除染作業の結 果、通常操業時の水準まで下 がった。

現在の汚染度は、一号炉の 管理棟で〇・五〇・七、二 レントゲン/時（二時間当た りの放射線の照射線量）、二 号炉で三・七、二レントゲン /時であり、敷地内のエロソ ール（大気中の粉じんや霧） 濃度は、許容値のほぼ十分の 一となっている。

同原発から半径三十キロ以内 の地表の汚染度は一様でな かった。

損害額は1.7兆円に

（ソ連・ノボボスチ通信）

チェルノブイリ惨事から2年

敷地内汚染度、平常時に

ソ連 報道

〈特別電信電話債券〉

銘柄	償還金額	10万円
第33回 (昭和54年5月発行)	1,200,000千円	512 7266 11184
第43回 (昭和55年5月発行)	600,000千円	9307 10811 17309

特別 電信電話債券